



- Il test per Zika virus va effettuato sui donatori che sono stati in determinate aree. L'elenco dei paesi a rischio viene aggiornato continuamente data l'evoluzione epidemiologica del virus. Per informazioni sulla diffusione del virus e raccomandazioni sulle misure preventive è necessario consultare i seguenti siti:

- **European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)**  
<https://ecdc.europa.eu/en/zika-virus-infection/threats-and-outbreaks/zika-transmission>
- **Centro Nazionale Trapianti**  
<http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/dettaglioComunicatiNotizieCnt.jsp?lingua=italiano&area=cnt&menu=media&sottomenu=news&id=376>
- **ISS**  
<https://www.epicentro.iss.it/zika/zika>
- **Center for Disease Control and Prevention (CDC)**  
<https://www.cdc.gov/zika/geo/united-states.html>  
<https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information>
- **Ministero della Salute**  
<http://www.salute.gov.it>

Il Ministero della Salute Italiana, in particolare l'Istituto Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti allo scopo di prevenire la diffusione dello Zika virus e controllare le possibili conseguenze di un'infezione contratta durante la gravidanza ha inteso diramare le seguenti misure precauzionali di sorveglianza (15/04/2016 Prot. 1223/CNT2016):

In caso di diagnosi di infezione da Zika virus, il prelievo ovocitario potrà essere effettuato trascorsi 120 giorni dalla cessazione dei sintomi.

Per le pazienti asintomatiche che abbiano soggiornato in una delle aree indicate nella lista dell'ECDC, si raccomanda di sospendere il prelievo di gameti femminili per 28 giorni dopo il ritorno dall'area affetta.

Le donne che abbiano avuto contatti sessuali con un uomo a cui è stata diagnosticata l'infezione da virus Zika o con un uomo che abbia viaggiato in una delle aree affette nei sei mesi precedenti al contatto sessuale possono donare/raccogliere gameti femminili dopo almeno 28 giorni dall'ultimo contatto sessuale.

Gli uomini con diagnosi di infezione da Zika virus, dovranno sospendere la raccolta del liquido seminale per i sei mesi successivi alla cessazione dei sintomi.

Gli uomini asintomatici che abbiano soggiornato in una delle aree indicate nella lista dell'ECDC, dovranno sospendere la raccolta di sperma per i sei mesi successivi al ritorno da zone in cui è segnalata la diffusione del virus.

La raccolta può essere effettuata prima dei sei mesi solo se viene effettuato un test con tecnica NAT su un campione di liquido seminale del paziente e il risultato è negativo.

Inoltre alle donne che stanno cercando una gravidanza o in gravidanza si consiglia di differire i viaggi verso tali aree.

Per ciò che concerne le attività di Procreazione Assistita, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC) e l'Organizzazione della salute PanAmericana (PAHO), raccomandano di **sospendere il prelievo di sperma da donatori omologhi e eterologhi durante i 6 mesi successivi** al ritorno da zone in cui è segnalata la diffusione del virus.

Inoltre alle donne che stanno cercando una gravidanza si consiglia di differire i viaggi non essenziali verso tali aree e di **sospendere il prelievo di ovociti durante i 28 giorni successivi** al ritorno da zone in cui è segnalata la diffusione del virus.

La sottoscritta \_\_\_\_\_ e il sottoscritto \_\_\_\_\_

Dichiariamo di:

non aver soggiornato in aree ad alta incidenza per infezione di virus Zika

SI dunque accettiamo di essere sottoposti ad ulteriori esami specifici

Firma lei \_\_\_\_\_

Firma lui \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_